

雑草対策



クジラグサ



ノミノフスマ



カラスノエンドウ



トゲミノ



ヤエム



タデ類



アメリカフウロ



ミチヤナギ




ママコノシリヌグイ

雑草対策

ハーモニー75DF水和剤

(チフェンスルフロメチル水和剤)



バサグラン液剤
 (ベンタゾン液剤)

アクチノール乳剤

(アイオキシニル乳剤)

薬剤名	処理時期	使用量	希釈水量
ハーモニー75DF 水和剤 (イネ科・広葉)	麦1葉期～ 節間伸長前まで	5～10g	100ℓ
	節間伸長開始期 ～穂ばらみ期	3～5g (小麦のみ)	100ℓ
アクチノール乳剤 (広葉のみ)	穂ばらみ期まで	100～ 200ml	70～ 100ℓ
バサグラン液剤 (広葉のみ)	小麦:収穫45日前まで (4月上旬まで) 大麦:収穫90日前まで (2月上旬まで)	100～ 200ml	70～ 100ℓ

「スズメノテッポウ」 「カズノコグサ」
ハーモニー75DF水和剤

カラスノエンドウ

トゲミノキツネノボタン

アメリカカフウロ

タデ類

ヤエムグラ

バサグラン液剤

MCP-ソーダ塩