

令和7年産飼料用米(夢あおば)栽培ごよみ

J A た が わ 営 農 部 44-3380
飯塚農林事務所田川普及指導センター 42-1428

水稻の生育経過と適期作業

月	旬	生育	水管理	主 な 作 業	実施時期 (月/日)
5	上	育 苗 期 間		有機物・土壌改良資材の投入	
	中				
	下				
6	上	田植え	浅水	耕起・代かき・基肥施用 箱施薬剤施用 ○移植 植付本数 3～4本／株 株間18～22cm(22cm以上は減収！) ○除草剤散布	
	中				
	下				
7	上	期分有効 間げつ	間断かん水	○有効分げつを確保	
	中	期分無効 間げつ			
	下				
8	上	穂の発 育期	間断かん水	葉色3.5 補正防除(紋枯病) 中干し後 ○穂肥2 穂肥1の10日後頃 基幹防除 出穂直前 ◀出穂期 8/17頃 (月 日) ※イネカメムシ、紋枯病に注意！ 補正防除(ウンカ類・カメムシ類) 出穂後	
	中	出穂期			
	下				浅水
9	上	登 熟 期	間断かん水	根を健全に保つため間断かん水を行う コンバインの清掃	
	中				
	下				
10	上		落水	■早期落水は減収！ 乾かないほ場を除き、極端に 早い落水厳禁！ □収穫時期 10月下旬頃	

※農薬使用の際は、必ずラベルの内容を確認しましょう！

《高収量を達成するためのポイント》

〇田植は6月25日までに終了しましょう。

〇栽植密度(株間)は、18～22cmで植えましょう(植付本数3～4本／株)。

〇肥沃なほ場を除き、肥料は上記基準どおり施用しましょう(減肥しない)。

施肥基準

(単位:kg/10a)

施肥 体系	肥 料 名	成分(%)			平坦・山ろく地			麦作後 (麦わら鋤き込み)		
		N	P	K	基肥	穂肥1	穂肥2	基肥	穂肥1	穂肥2
①	Jコート2000	20	10	10	60	—	—	70	—	—
②	ハイエムコート30	30	5	5	40	—	—	45	—	—
③	クミアイ化成ベスト444号	14	14	14	50	—	—	55	—	—
	NK化成2号	16	0	16	—	20	15	—	20	15
④	機械施肥専用242号(側条施肥)	12	14	12	50	—	—	55	—	—
	NK化成2号	16	0	16	—	20	15	—	20	15
⑤	牛糞堆肥(成分は化学肥料換算%)	0.12	0.36	0.63	2000	—	—	2000	—	—
	硫安	21	0	0	25	10	10	30	10	10

病虫害防除

	時 期	農 薬	対照病虫害	施用量
箱施薬	播種時～移植当日 (覆土前)	防人箱粒剤	いもち病 ウンカ類 コブノメイガ	50g/箱
基幹防除 (出穂直前)	8月中旬	エクシードフロアブル	ウンカ類 カメムシ類	2000倍 60～150L/10a
補正防除	8月上旬が目安 (収穫21日前まで)	モンセレンフロアブル	紋枯病	1500倍 100L/10a
	8月下旬が目安 (収穫7日前まで)	スタークルメイト液剤10	ウンカ類 カメムシ類	1000倍 60～150L/10a

〇高温条件下で、紋枯病が発生しやすくなります。高温が予想される又は前年に紋枯病が発生していたほ場は、モンセレンフロアブルを散布しましょう。

〇基幹防除の後も、ウンカ類・カメムシ類の発生が多い場合は、基幹防除の1週間～10日後(8月下旬頃)を目安にスタークルメイト10液剤を散布しましょう。

除草剤

ステージ	除草剤の名称	使用時期	使用量(10a当たり)		使用上の注意
			薬量	希釈水量	
田植同時	イノーバDX1キロ粒剤51	移植時・移植直後～ノビエ2.0葉期まで ただし、移植後30日まで	1kg	—	薬剤が水中に分散してからほ場全体に効果を発揮するので、田植え後速やかに入水する。
	ラオウ1キロ粒剤(大型規格)	移植時・移植直後～ノビエ2.5葉期まで ただし、移植後30日まで	1kg	—	・稲は5葉期を仰るころが田植えの適期。 ・田面が露出しないように湛水して散布する。 ・散布後7日間は落水や掛け流しをしない。 ・浅植えや深植えの場合は、薬害を生ずる恐れがあるので注意。
田植え後	カウンスルコンプリート1キロ粒剤	移植時・移植直後～ノビエ3.5葉期まで ただし、移植後30日まで	1kg	—	・田面が露出しないように湛水して散布し、7日間は落水や掛け流しをしない。 ・クリンチャーEWを使用の際は展着剤を加用する。 ・クリンチャーEWは湛水散布も可。
	カウンスルエナジーフロアブル	移植時・移植直後～ノビエ3.5葉期まで ただし、移植後30日まで	500mℓ	—	・田面が露出しないように湛水して散布し、7日間は落水や掛け流しをしない。 ・クリンチャーEWを使用の際は展着剤を加用する。 ・クリンチャーEWは湛水散布も可。
生育期	カウンスルコンプリートジャンボ	移植後5日～ノビエ3.5葉期まで ただし、移植後30日まで	10個(300g)	—	・田面が露出しないように湛水して散布し、7日間は落水や掛け流しをしない。 ・クリンチャーEWを使用の際は展着剤を加用する。 ・クリンチャーEWは湛水散布も可。
	クリンチャー1キロ粒剤	移植後7日～ノビエ4葉期まで ただし、収穫30日前まで	1kg	—	・田面が露出しないように湛水して散布し、7日間は落水や掛け流しをしない。 ・クリンチャーEWを使用の際は展着剤を加用する。 ・クリンチャーEWは湛水散布も可。
	クリンチャージャンボ	移植後25日～ノビエ5葉期まで ただし、収穫30日前まで	1.5kg	—	・田面が露出しないように湛水して散布し、7日間は落水や掛け流しをしない。 ・クリンチャーEWを使用の際は展着剤を加用する。 ・クリンチャーEWは湛水散布も可。
	クリンチャージャンボ	移植後7日～ノビエ4葉期まで ただし、収穫30日前まで	20個(1kg)	—	・田面が露出しないように湛水して散布し、7日間は落水や掛け流しをしない。 ・クリンチャーEWを使用の際は展着剤を加用する。 ・クリンチャーEWは湛水散布も可。
	クリンチャーEW	移植後25日～ノビエ5葉期まで ただし、収穫30日前まで	30個(1.5kg)	—	・田面が露出しないように湛水して散布し、7日間は落水や掛け流しをしない。 ・クリンチャーEWを使用の際は展着剤を加用する。 ・クリンチャーEWは湛水散布も可。
	クリンチャーEW	移植後20日～ノビエ6葉期まで ただし、収穫30日前まで	100mℓ	25～100ℓ	・田面が露出しないように湛水して散布し、7日間は落水や掛け流しをしない。 ・クリンチャーEWを使用の際は展着剤を加用する。 ・クリンチャーEWは湛水散布も可。
	バサグラン粒剤	移植後15日～収穫45日前まで	3～4kg	—	・田面が露出しないように湛水して散布し、7日間は落水や掛け流しをしない。 ・クリンチャーEWを使用の際は展着剤を加用する。 ・クリンチャーEWは湛水散布も可。
	バサグラン液剤	移植後15日～収穫45日前まで	500～700mℓ	70～100ℓ	・田面が露出しないように湛水して散布し、7日間は落水や掛け流しをしない。 ・クリンチャーEWを使用の際は展着剤を加用する。 ・クリンチャーEWは湛水散布も可。
	ウイードコア1キロ粒剤	移植後7日～ノビエ4葉期まで ただし、収穫60日前まで	1kg	—	・田面が露出しないように湛水して散布し、7日間は落水や掛け流しをしない。 ・クリンチャーEWを使用の際は展着剤を加用する。 ・クリンチャーEWは湛水散布も可。
	クリンチャーバスME液剤	移植後15日～ノビエ5葉期まで ただし、収穫50日前まで	1000mℓ	70～100ℓ	・田面が露出しないように湛水して散布し、7日間は落水や掛け流しをしない。 ・クリンチャーEWを使用の際は展着剤を加用する。 ・クリンチャーEWは湛水散布も可。

品種特性(目安)

熟期 区分	出穂期 月.日	黄熟期 月.日	収穫 時期	稈長cm	乾物全 重t/10a	玄米重 t/10a
早生	8.17	9.15	10月下	86	1.52	0.72

令和7年1月作成